

Évaluation

Conseils d'utilisation : Les types de questions d'évaluation sont :

- 1) narration ;
- 2) remplir les blancs / compléter des phrases.

Combinez-les de différentes manières pour la préévaluation et la postévaluation. Chaque type d'évaluation couvre un contenu différent. Aucun sous-ensemble ne couvre tous les acquis. Assurez-vous d'inclure des questions d'évaluation pour chaque acquis quand vous les associez.

Les trois principaux usages des questions d'évaluation sont : a) les poser à l'ensemble du groupe de manière informelle, b) les assigner de manière semi-informelle à des petits groupes ou c) les poser de manière formelle et individuelle pour obtenir des réponses écrites.

Vous trouverez d'autres suggestions d'évaluation après le tableau.

Questions d'évaluation pour le cours 3.9	
Questions	Réponses
Narration <i>Remarque : Organisez les évaluations narratives à partir de questions, demandes ou instructions</i>	
1. Donnez trois raisons pour lesquelles il est important pour le personnel de maintien de la paix d'être formé sur le VIH / SIDA.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ pour protéger leur santé ▪ pour protéger la santé des autres ▪ protéger la légitimité de la mission ▪ pour obtenir un traitement et bien vivre en cas de séropositivité ▪ parce que les opérations de maintien de la paix peuvent présenter un risque accru en matière de transmission du VIH.
2. SIDA – citez les mots correspondant à chaque lettre, et expliquez-les.	<p>S – Syndrome</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ ensemble de symptômes associés à une maladie particulière <p>I – de l'Immuno-</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ le système immunitaire est le système de défense du corps contre la maladie et l'infection ▪ Le SIDA attaque et tue les « cellules combattantes » <p>D – Déficience</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ ne fonctionnant pas correctement, manquant de cellules combattantes pour défendre le corps – le système immunitaire est faible <p>A – Acquise</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ le virus provient d'une autre personne contaminée <p>Une infection VIH non traitée se transforme en</p>

	SIDA.
3. Décrivez en quoi le VIH ressemble à un sniper.	Le système immunitaire utilise des « cellules soldats » pour protéger le corps de la maladie et de l'infection. Le VIH entre dans le corps et agit comme un sniper, qui se cache le temps qu'il faut pour affaiblir le système immunitaire. Il tue les cellules combattantes. Le système immunitaire devient trop faible pour protéger la personne des maladies. La personne qui porte le VIH devient alors malade du SIDA.
4. Qu'est-ce qu'un syndrome ?	Un groupe de problèmes de santé qui indique une maladie ou un état.
5. Expliquez trois manières dont un contact avec du sang contaminé peut transmettre le VIH.	<ol style="list-style-type: none"> 1. transfusions de sang contaminé 2. utilisation de matériel chirurgical ou d'injection contaminé 3. exposition à des personnes blessées, par ex. accidents de la route
6. Citez au moins cinq manières dont le VIH ne se transmet pas.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ contact informel non sexuel <ul style="list-style-type: none"> - se serrer la main - se toucher et se serrer dans les bras - manger de la nourriture préparée par une personne séropositive - s'embrasser : il n'existe aucun cas documenté de transmission du VIH par la salive ▪ animaux ou insectes ▪ eau ▪ toilettes ▪ visite à l'hôpital ▪ tousser ou éternuer ▪ partager de la nourriture, des couverts, un verre ▪ le fait de travailler, de vivre de partager une pièce avec une personne séropositive
7. Comment réduire le risque de transmission du VIH ? Donnez des exemples pour les trois manières principales.	<p>Rapport sexuel</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Utilisez les préservatifs correctement et systématiquement ▪ Réduisez le nombre de partenaires sexuels. ▪ Prenez connaissance de votre statut VIH et de celui de votre partenaire, et entretenez une relation monogame. ▪ S'abstenir : la seule méthode efficace à 100 % <p>Exposition au sang</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ne partagez pas, n'utilisez pas d'aiguilles hypodermiques non stériles ▪ Quand vous vous occupez de personnes blessées, utilisez un équipement de protection individuelle

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Vérifiez qu'un approvisionnement en sang sain est disponible. <p>De la mère à l'enfant</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Demandez l'avis médical d'un professionnel de santé au début de la grossesse ▪ Grâce à un traitement, une mère séropositive peut donner naissance à un bébé non infecté
8. Quelles sont les règles de l'ONU qui limitent les relations sexuelles du personnel de maintien de la paix avec la population locale ?	<p>Interdit</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ acheter ou échanger quoi que ce soit pour obtenir des relations sexuelles ▪ toute forme d'exploitation ▪ relations sexuelles avec des prostituées ▪ relations sexuelles avec des personnes âgées de moins de 18 ans <p>Fortement déconseillé</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ relations sexuelles avec la population locale
9. Comment répondriez-vous à un partenaire sexuel qui ne voudrait pas utiliser un préservatif ?	<p>Les réponses diffèrent. C'est un sujet très personnel. Chacun doit avoir une sorte de stratégie. Si ce n'est pas le cas, imaginez des scénarios avec eux. S'y entraîner avant d'avoir besoin de négocier des relations sexuelles peut les protéger, voire même sauver des vies. La meilleure réponse est de refuser le rapport, de retirer son consentement, si un partenaire refuse de porter un préservatif.</p>
10. Que signifie « séropositif » ?	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Cela signifie qu'une personne est infectée par le VIH, le virus de l'immunodéficience humaine. ▪ Non traité, il peut se transformer en SIDA.
11. Pourquoi est-il important de connaître son statut VIH ?	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Vous protéger à l'avenir si vous êtes séronégatif ▪ Protéger les autres, si vous êtes séropositif ▪ Modifier votre mode de vie ▪ Gérer votre état de santé
12. Qu'est-ce que le TPE ?	<p>Traitement post-exposition (TPE)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Traitement d'urgence uniquement – non préventif ▪ à commencer le plus rapidement possible après l'exposition ▪ peut ne pas être efficace après 72 heures
13. Comment les stéréotypes ont-ils mené à la stigmatisation ?	<p>Les stéréotypes comprennent :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ l'idée que seulement certains genres de personnes risquent de contracter le VIH – hommes homosexuels, ou prostituées ; ▪ l'idée moralisatrice selon laquelle les personnes qui contractent le VIH le méritent en quelque sorte ; ▪ la croyance erronée selon laquelle le VIH ne se transmet que via les rapports sexuels ;

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ le VIH peut contaminer n'importe qui. <p>Les personnels de maintien de la paix de l'ONU doivent montrer l'exemple en ce qui concerne la fin de la stigmatisation, de la marginalisation et de l'exclusion des personnes séropositives ou souffrant du SIDA. C'est-à-dire, vous.</p>
14. Comment traitez un collègue séropositif ?	<p>Avec :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ le même respect qu'avec vos autres collègues ▪ soutien et information, si nécessaire ▪ respect total de l'anonymat de la personne ▪ confidentialité de son état de santé <p>Sans :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ stigmatisation ▪ jugement négatif ▪ exclusion ▪ marginalisation
Vrai-faux	
1. Le Conseil de sécurité et le secrétaire général des Nations Unies exigent que l'ensemble du personnel de maintien de la paix soit régulièrement formé sur la transmission du VIH.	<p>Vrai</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ en partie lors de la formation pré-déploiement ▪ de manière plus détaillée lors du briefing en mission ▪ Le dépistage volontaire anonyme et un service de conseil sont accessibles dans toutes les missions.
2. Le VIH n'est pas génétique, mais le SIDA porte un composant génétique.	<p>Faux</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Le VIH et le SIDA ne sont pas génétiques. ▪ Ils ne sont pas non plus le résultat de mutations ou de modifications des cellules ▪ « A » de SIDA = acquis, via une personne contaminée
3. On peut savoir si une personne porte le VIH ou a le SIDA en la regardant.	<p>Faux</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Il est impossible de savoir si une personne porte le VIH ou a le SIDA – surtout si elle suit un traitement
4. Toute personne infectée par le VIH peut le transmettre à une autre personne.	<p>Vrai</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Les éléments suivants n'ont aucune influence, que la personne : <ul style="list-style-type: none"> a) ait l'air malade ou en bonne santé ; b) suive un traitement contre le VIH ; c) ait un diagnostic pour le SIDA ou non ; d) ait été dépistée pour le VIH ou non.
5. Les rapports sexuels vaginaux, anaux et oraux peuvent tous transmettre le VIH avec une personne infectée.	<p>Vrai</p>
6. Comme le SIDA est un syndrome, les gens peuvent le contracter de nombreuses manières différentes.	<p>Faux</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Le terme « syndrome » fait référence à un groupe de problèmes de santé qui indique une maladie ou un état en particulier.

	<p>On « n'attrape pas » le SIDA – une personne infectée transmet le VIH l'infection qui affaiblit le corps jusqu'à ce qu'on développe le SIDA.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ L'infection du VIH ne se transmet que de trois façons : <ol style="list-style-type: none"> 1. contact sexuel avec le sperme ou les sécrétions vaginales d'une personne infectée 2. contact avec du sang contaminé par le VIH ▪ par une mère porteuse du VIH à son bébé, pendant la grossesse ou à la naissance
7. Un préservatif peut contenir jusqu'à 7 litres de fluide.	<p>Vrai</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ tout homme qui déclare que les préservatifs sont trop petits pour lui doit voir un médecin
8. En général, les femmes peuvent compter sur la plupart des hommes pour avoir des préservatifs.	<p>Faux</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Les femmes sont tout aussi responsables que les hommes de prévoir, d'avoir des préservatifs avec elles quand elles envisagent d'avoir des relations sexuelles. Il est trop risqué pour les femmes de compter sur les hommes pour les protéger. Elles doivent se protéger seules. ▪ Certains hommes peuvent : <ol style="list-style-type: none"> 1. ne pas connaître le VIH 2. ne pas vouloir porter un préservatif 3. ne pas être préparés 4. ne pas être responsables
9. Le préservatif féminin est prévu pour être utilisé dans le vagin uniquement	<p>Vrai.</p>
10. Le dépistage volontaire anonyme et un service de conseil ne sont disponibles que dans les missions politiques et les missions de maintien de la paix intégrées multi-dimensionnelles.	<p>Faux</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Le dépistage volontaire anonyme et un service de conseil sont accessibles dans <u>toutes</u> les missions politiques et le maintien de la paix.
11. Un traitement à base de médicaments antirétroviraux permet aux personnes porteuses du VIH de ralentir la progression vers le SIDA.	<p>Vrai</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Les ARV permettent aux personnes porteuses du VIH de maintenir une bonne qualité de vie.
12. La stigmatisation, la disgrâce sociale et l'exclusion des personnes séropositives peuvent être aussi néfastes, voire pires que la maladie.	<p>Vrai</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ les stéréotypes et les informations inexactes sur le VIH et le SIDA sont courants ▪ de nombreuses réactions précoces, quand le VIH est apparu à la fin du XXe siècle sont le fruits de la peur, du manque de connaissances et des préjugés ▪ les stéréotypes et les préjugés négatifs continuent d'alimenter la manière dont

	<p>certaines personnes et communautés traitent les séropositifs / malades du SIDA</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Le personnel de l'ONU doit garantir le respect total des droits des personnes qui vivent avec le VIH en matière de : <ol style="list-style-type: none"> 1. confidentialité 2. égalité 3. non-stigmatisation
Complétez	
1. _____ est un virus qui entraîne l'affaiblissement du système de défense humain contre les maladies.	<p>VIH Virus de l'Immunodéficience Humaine</p>
2. Le VIH se transmet principalement de _____ façons. Citez-les.	<p>trois</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. contact sexuel avec le sperme ou les sécrétions vaginales d'une personne infectée 2. contact avec du sang contaminé par le VIH 3. transmission d'une mère porteuse du VIH à son bébé, pendant la grossesse ou à la naissance
3. Le VIH ne se transmet pas par _____ ou _____.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ contact informel non sexuel <ul style="list-style-type: none"> - se serrer la main - se toucher et se serrer dans les bras - manger de la nourriture préparée par une personne séropositive - s'embrasser : il n'existe aucun cas documenté de transmission du VIH par la salive ▪ animaux ou insectes ▪ eau ▪ toilettes ▪ visite à l'hôpital ▪ tousser ou éternuer ▪ partager de la nourriture, des couverts, un verre ▪ le fait de travailler, de vivre de partager une pièce avec une personne séropositive
4. _____ est le seul moyen efficace à 100 % pour empêcher la transmission du VIH.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ L'abstinence, ne pas avoir de relations sexuelles avec une autre personne
5. Si vous avez des relations sexuelles, utilisez un _____ pour vous protéger.	<p>préservatif</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ préservatif masculin ou féminin ▪ un seul à la fois, pas deux
6. Vous avez _____ de vous protéger, de protéger votre santé, _____ de protéger votre partenaire.	<p>le droit de vous protéger la responsabilité de protéger votre partenaire</p>
7. Les opérations de maintien de la paix mettent discrètement à disposition les préservatifs _____ et _____.	<p>féminin et masculin</p>

8. La friction entre deux préservatifs peut _____ un, faisant augmenter les risques. N'utilisez qu'un seul préservatif.	déchirer <ul style="list-style-type: none"> ▪ Cela s'applique à deux préservatifs masculins ou à un masculin, un féminin.
9. _____ est le seul moyen de savoir si vous portez le VIH.	Le dépistage <ul style="list-style-type: none"> ▪ toutes les missions de maintien de la paix un service de conseil et de dépistage volontaire anonyme
10. Le service de conseil et de dépistage volontaire en mission est entièrement _____.	confidentiel / anonyme
11. _____ immédiatement si vous êtes exposé au VIH.	Demandez immédiatement une aide médicale, consultez un médecin
12. Les personnes séropositives peuvent rester en bonne santé et vivre correctement - _____ et _____ sont essentiels.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ dépistage précoce ▪ traitement
13. L'ONU exige de l'ensemble de son personnel qu'il traite les personnes séropositives avec _____, _____ et _____.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ confidentialité ▪ égalité ▪ non-stigmatisation <p>On peut aussi parler de plein respect des droits humains.</p>

Autres méthodes d'évaluation

- **Évaluation générale** Servez-vous des quatre acquis pour évaluer les apprentissages. Demandez aux participants d'expliquer
 1. ce qu'est le VIH / SIDA et comment se transmet le VIH ;
 2. comment prévenir la transmission du virus du VIH ;
 3. quoi faire lorsque l'on est exposé au VIH ;
 4. ce qu'il faut faire si l'on est séropositif.

Jugez du caractère complet des réponses. Si elles ne sont pas exactes ni complètes, donnez des devoirs indépendants pour combler les lacunes.